



Impacto de la pandemia Covid 19 en la adherencia al control y tratamiento del glaucoma. Corrientes, Argentina. 2022

Franco Schwartz, Paula Pared, Alejandro Schaffer, Ignacio Romero Artaza, Rosana Gerometta,

RESUMEN

Objetivo. Determinar la adherencia al control y tratamiento oftalmológico de pacientes con glaucoma durante el periodo de pandemia Covid 19 en un centro de salud privado de la ciudad de Corrientes.

Métodos. Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. La muestra fue conformada a partir del análisis de 23 historias clínicas e incluye y estudia 7 casos que cumplieron con los criterios de inclusión. La recolección de datos se realizó a través de una encuesta telefónica debido a barreras como el ASPO y la falta de familiaridad con la tecnología por parte de los encuestados, con preguntas de tipo abierta y cerradas.

Resultados. La edad promedio de los pacientes fue de 70 años, predominando los de sexo femenino (71,43%), siendo la hipertensión arterial y la diabetes las principales comorbilidades. Durante este periodo, 5 de ellos fueron tratados con Latanoprost 0,0005%, uno con Brimonidina al 0,15% y Travoprost 0,04% y uno de ellos con Travoprost 0,004% más Timolol 0,5%. El estudio revela que el 71,43% (5) de la población en estudio acudió a la consulta durante el período de pandemia, y el 100% de los mismos no abandonaron ni interrumpieron su tratamiento.

Conclusión. Los pacientes con glaucoma que fueron analizados, con comorbilidades tanto oftalmológicas como no oftalmológicas, se evidenció que durante el periodo de ASPO mantuvieron o mejoraron la PIO, lo que nos habla de que tuvieron una buena adherencia al tratamiento.